



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

4º FORO DE LACTANCIA MATERNA

Semana Mundial de Lactancia Materna 2016

Reconocimientos

- Secretaría de Salud Federal: Subsecretaría Prevención y Promoción de la Salud y Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
- Secretarías de Salud estatales (Chihuahua, Puebla)
- OPS y OMS, UNICEF
- Instituto Nacional de Salud Pública

Prácticas de lactancia a nivel mundial

Si todos los niños fueran alimentados al seno materno dentro de la primera hora de vida y fueran alimentados de acuerdo a las recomendaciones actuales, se salvarían a nivel mundial cerca de 800,000 vidas



Black, et al. 2013; WHO, 2015

Prácticas de lactancia a nivel mundial

Menos del 40% de niños menores de 6 meses son alimentados con lactancia materna exclusiva

América Latina y el Caribe <50% empiezan lactancia materna (LM) los primeros 60 minutos después del parto

Solamente 58% de niños 20-24 meses se benefician de la práctica de lactancia materna



UNICEF, 2015; WHO, 2015

Barreras para la lactancia materna en América Latina

Percepción de producción insuficiente de leche

La falta de confianza en la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses

Profesionales de la salud que aconsejan la introducción de fórmulas lácteas y abandonar la lactancia prematuramente

Organización Panamericana de la Salud, 2013

Barreras para la lactancia materna en América Latina

La falta de espacios adecuados para extraer leche materna durante la jornada laboral

Falta de políticas que respalden la lactancia materna o la vigilancia de su aplicación.

Bombardeo comercial de las fórmulas lácteas y su alta disponibilidad.

Organización Panamericana de la Salud, 2013

Objetivos

Estimar la prevalencia de violaciones del Código Internacional de Comercialización del Sucedáneo de la Leche Materna (Código) en México:

Chihuahua y Puebla:

Madres de niños menores de 24 meses

Provedores y unidades de salud de primer nivel

Puntos de venta

Medios de comunicación

Etiquetado de productos para niños menores de 24 meses

Método

Protocolo de NetCode Basada en los Protocolos del Grupo Intergerencial de Monitoreo de la Lactancia Materna (IGBM) y del Network for Global Monitoring of the Code (Net Code).


Muestra:

Madres de niños: 660 (330 por estado)


Unidades de salud: 40 (20 por estado)

Puntos de venta: 20 (10 por estado)


Recomendaciones, muestras, cupones y regalos para niños menores 6 meses. Quién lo recomienda (54%)




Recomendaciones, muestras, cupones y regalos para niños menores 6 meses (54%). Dónde



Sucedáneos recomendados (n=319)



Tipo de sucedáneo recibido por las madres (11 %)



Conocimiento del código


Del personal de salud entrevistado:

42% conoce el Código

56% conoce las medidas para implementarlo

25% ha recibido capacitación en el código

Publicidad en medios



Conclusiones

Las mayoría de las madres entrevistadas:

Recibieron la recomendación de utilizar sucedáneos de la leche materna principalmente por el personal de salud (médicos)


Están expuestas a promoción de sucedáneos de leche materna en medios de comunicación (Nestlé y Mead Johnson)

Conclusiones

Casi la mitad de los médicos entrevistados desconocen el código internacional de comercialización y/o medidas nacionales para su implementación.

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (Asamblea Mundial de la Salud, 1981)

Proteger y fomentar la lactancia materna mediante el suministro de información acerca de la alimentación adecuada de los lactantes y la regulación de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, los biberones y chupones.



Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

Derivado de evidencia sobre la morbi-mortalidad infantil relacionado con el uso de fórmulas lácteas, asociada con mercadotecnia agresiva de sucedáneos de leche materna


Su cumplimiento es voluntario tanto por gobiernos, sistemas y trabajadores de salud, como por empresas productoras de sucedáneos de la leche materna

El código internacional establece:


Todas las **etiquetas** de los sucedáneos deben **declarar la superioridad de la leche materna y los beneficios de la lactancia materna**, así como los riesgos de los sucedáneos de la leche materna

No se debe idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna

No se debe hacer promoción de los sucedáneos de la leche materna




- **No** se deben **distribuir muestras gratis** de sucedáneos de la leche materna a unidades o personal de salud
- Las **unidades y personal de salud no** debe **promover el uso de sucedáneos** de la leche materna
- **Prohibición de «visitadores»** de compañías de sucedáneos de la leche materna para hacer promoción de sus productos
- **Prohibición de obsequios** para personal de salud por parte de las compañías de sucedáneos de la leche materna



Estrategias recomendadas para proteger prácticas de lactancia materna: disminuir la promoción de sucedáneos de la leche

Promover y fortalecer el Monitoreo del Cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucédáneos de la Leche Materna (código).

Fortalecer la legislación que favorezca el cumplimiento del código Internacional de Comercialización de Sucédáneos de la Leche Materna (sanciones claras)





MADRE Y NIÑO - PABLO PICASSO

Gracias



Pablo Picasso Madre e hijo
1905. Gouache. Colección
Privada. París. Francia.

